

| 思远 |

黑色素瘤



版权声明

本手册版权属于上海思泰得生物技术有限公司所有, 未经本公司书面许可, 任何个人或组织均不得以任何形式将本手册中的各项内容进行复制、拷贝、编辑或翻译为其他语言。

标准医学检验云平台创导者

Pioneer of Standard Medical Cloud

■ 思泰得

上海思泰得生物技术有限公司,简称思泰得,音译于Standard (标准);精准的医学检验与高效的AI分析云平台双引擎并驾齐驱,助力思泰得成为标准医学检验云平台的创导者。

思泰得是领先的独立第三方医学检验机构。拥有思泰得精准(北京)医学检验实验室有限公司、武汉思泰得医学检验实验室有限公司以及宁夏思泰得健康管理有限公司。

思泰得依托不断创新的分子检测技术,结合形态学、免疫学和遗传学等标准检测平台,以严谨的科学态度和患者至上的服务理念,提升国人健康管理意识,促进中国医学检验水准提高。

思远 | 黑色素瘤

检测服务代码	诊疗路径	检测内容	样本类型	检测方法	报告时间
Me5101	辅助诊断/用药指导/预后判断	黑色素瘤热点基因检测	外周血/蜡块、白片/新鲜组织	NGS	7

* 实体瘤送检要求

检测方法	样本	样本量	样本要求	物流要求
qPCR	新鲜肿瘤组织	黄豆粒大小	术后半小时内置于专用的组织保存液中。	2-8°C
	石蜡组织	切片5-10张	厚度5-8um石蜡切片;活检/穿刺组织10张;可提供蜡块。	常温
	外周血	抗凝血5-10ml	EDTA抗凝管(如果是捕获法请用游离DNA专用管);运输途中做好固定,防止剧烈颠簸引发样本溶血;	2-8°C
Sanger sequencing	骨髓血	抗凝血2ml	EDTA抗凝管;运输途中做好固定,防止剧烈颠簸引发样本溶血;	2-8°C
	细胞 (for RNA)	>1×10 ⁶ 细胞	>1×10 ⁶ 细胞;TRIzol保存。	2-8°C
	细胞 (for DNA)	>1×10 ⁶ 细胞	>1×10 ⁶ 细胞。	2-8°C
NGS	DNA (注明样本类型,如石蜡,血液)	10ng/ul以上 50ul	OD ₂₆₀ /OD ₂₈₀ 比值:1.6-1.8。	2-8°C
	RNA (注明样本类型,如石蜡,血液)	100ng/ul以上 100ul	OD ₂₆₀ /OD ₂₈₀ 比值:1.7-2.0。	2-8°C
	定制捕获DNA (Exon等)	1%琼脂糖质检: DNA ≥0.5μg Qubit	合格:50ng样本和标准品电泳检测,样本应为清晰的条带。不合格:若出现拖尾或弥散,则提示为DNA样本降解,出现杂带,则提示有杂质。	2-8°C
dPCR	新鲜肿瘤组织	黄豆粒大小	手术后半小时内置于专用的组织保存液中。	2-8°C
	石蜡组织	5-10张切片	厚度5-8um石蜡切片;活检/穿刺组织10张;可提供蜡块。	常温
	外周血	抗凝血5-10ml	游离DNA专用保存管;运输途中做好固定,防止剧烈颠簸引发样本溶血。	2-8°C
FISH	单项检测:石蜡包埋肿瘤组织/白片	4张切片	厚度3-5 μm,未染色白片,建议划出肿瘤区域;可提供蜡块。	常温
	多项检测:石蜡组织/白片	3张切片/项目	厚度3-5 μm,未染色白片,建议划出肿瘤区域;可提供蜡块。	常温
	细胞悬液	浑浊状细胞悬液 (>1×10 ⁶ 细胞)	细胞悬液用固定液(甲醇:乙酸=3:1)保存。	2-8°C
Nanostring	新鲜组织	重约25mg(肉眼可见)	厚度<2mm的碎块;RNA保存液低温运输。	2-8°C
	石蜡组织	切片5-10张	厚度3-5um;两周内石蜡切片;活检/穿刺组织10张;可提供蜡块。	常温
	细胞	>1×10 ⁶ 细胞	至少1×10 ⁶ 细胞;TRIzol保存。	2-8°C
	血液	>1×10 ⁶ 白细胞沉淀	新鲜抗凝血,加入红细胞裂解液,裂解后离心收集白细胞沉淀(>1×10 ⁶ 细胞),加入1mL TRIzol混匀保存(详细流程参考红细胞裂解液说明书)。	2-8°C
CTC(循环肿瘤细胞)	外周血	5-10ml	游离DNA专用保存管;运输途中防止剧烈颠簸引起溶血;采集后及时送检。	2-8°C
特殊样本	胸腹水	50ml	尽量避免大量血性胸腹水(取穿刺液中间段留取)。	2-8°C



北京

Beijing

宁夏

Ningxia

武汉

Wuhan

上海

Shanghai

总部
上海思泰得生物技术有限公司
上海市奉贤区岚丰路1150号1幢5709室
Room 5709, Unit 1, No. 1150 Lan Feng Road,
Feng Xian District, Shanghai

思泰得
上海思泰得生物技术有限公司
思泰得精准(北京)医学检验实验室有限公司
武汉思泰得医学检验实验室有限公司
宁夏思泰得健康管理有限公司



www.stdlbio.com

上海思泰得生物技术有限公司
Shanghai STDL Biotechnology Co.,Ltd

中国上海市奉贤区岚丰路1150号1幢5709室
Room 5709, Unit 1, No. 1150 Lan Feng Road,
Feng Xian District, Shanghai, China

本手册仅供医疗卫生专业人士学习、交流和研究使用，请勿用于商业用途，违者必究。
版权声明：本手册版权属于上海思泰得生物技术有限公司所有，未经本公司书面许可，任何个人或组织均不得以任何形式将本手册中的各项内容进行复制、拷贝、编辑或翻译为其他语言。
本手册中所有商标或标志均属于上海思泰得生物技术有限公司及其提供者所有。